

Für Ihre Patientenakte

Einschätzung des Blutungsrisikos

Patient

Geburtsdatum

Blutgruppe

Datum

Praxisstempel

Vom Arzt oder Patienten anzukreuzen bzw. zu ergänzen

ja nein

- Ist bei Ihnen eine Blutgerinnungsstörung oder eine Thrombose festgestellt worden? ja nein
- Gab oder gibt es Fälle von Blutungsneigungen in der Familie? ja nein
- Heilen Ihre Wunden schlecht ab? ja nein

Beobachten Sie vermehrt folgende Blutungsarten – auch ohne erkennbaren Grund?

- Nasenbluten (beide Nasenlöcher gleichzeitig oder abwechselnd; ohne andere Ursachen wie Infekte der oberen Atemwege; trockene Luft, z. B. in der Heizperiode; starkes Schneuzen) ja nein
- Blaue Flecken oder kleine, punktförmige Blutungen mehr als 1- bis 2-mal pro Woche (vor allem am Körperrumpf und anderen, ungewöhnlichen Stellen) ja nein
- Spontane Gelenk- oder Muskel-/Weichteilblutungen ja nein
- Zahnfleischbluten und Blutungen der Mundschleimhaut ja nein

Beobachten Sie ungewöhnlich lange bzw. verstärkte Blutungen nach Verletzungen und Eingriffen?

- Blutungen nach Schnitt- oder Schürfwunden (z. B. durch Rasieren), mehr als 5 Minuten ja nein
- Blutungen während oder nach dem Ziehen von Zähnen, oder während und nach der professionellen Zahnreinigung ja nein
- Blutungen während oder nach Operationen (z. B. Mandeloperationen, Blinddarmoperationen, Geburten) ja nein

Nehmen Sie Medikamente ein, die die Blutgerinnung beeinflussen (können)?

- Schmerz- und Rheumamittel: ja nein
- Medikamente zur Blutverdünnung: ja nein
- Weitere Medikamente oder Vitaminpräparate: ja nein

Von Frauen und Mädchen zu beantworten:

- Haben Sie den Eindruck, dass die Monatsblutungen verlängert (plus 7 Tage) und/oder verstärkt sind (häufiger Binden-/Tamponwechsel, mehr als 3 Vorlagen pro Tag)? ja nein

Hinweise zur Bearbeitung Differenzierung und Bewertung durch den Arzt

➔ Diagnose erfragen	2
➔ Verwandtschaftsgrad	
➔ Diagnose bekannt	2
➔ lange nässend, klaffend	2
➔ vereitert	2
➔ Keloidbildung	2
➔ immer schon	2
➔ nur saisonal	3
➔ HNO-Befund vorhanden	
➔ bei Medikamenteneinnahme	1
➔ arterielle Hypertonie	4
➔ traumafördernde Tätigkeiten	0
➔ immer schon	2
➔ bei Medikamenteneinnahme	1
➔ Paradontitis	0
➔ über 5 Minuten	2
➔ typische Verletzung (Nassrasur)	2
➔ bei Medikamenteneinnahme	1
➔ über 5 Minuten	2
➔ Nachbehandlung war nötig	2
➔ bei Medikamenteneinnahme	1
➔ welche Operation	5
➔ Gabe von Blutkonserven oder Blutprodukten?	5; 2
➔ Blutungsneigung seit Medikamenteneinnahme	2; 4; 6
➔ seit Menarche	2